

Direktor: Prof. Dr. W. Hinkelbein

Prostatakarzinom

Tumorstadien - TNM-System

Die Verschlüsselung der Tumorstadien erfolgt nach dem TNM-System der UICC: TNM classification of malignant tumors. 6th edn (2002)
Sobin LH., Wittekind Ch. (eds.) Wiley, New York

T - Primärtumor

T1	Klinisch nicht erkennbarer Tumor, weder tastbar, noch in bildgebenden Verfahren sichtbar
T1a	zufälliger histologischer Befund in 5% oder weniger des resezierten Gewebes
T1b	zufälliger histologischer Befund in mehr als 5% des resezierten Gewebes
T1c	Tumor durch Nadelbiopsie diagnostiziert (z.B. wegen erhöhtem PSA-Wert)
T2	Der Tumor begrenzt auf die Prostata
T2a	weniger als die Hälfte eines Lappens befallen
T2b	mehr als die Hälfte eines Lappens befallen
T2c	beide Lappen befallen
T3	Der Tumor durchbricht die Prostatakapsel
T3a	extrakapsuläre Ausbreitung
T3b	Tumor infiltriert die Samenblase
T4	Der Tumor ist fixiert oder infiltriert andere benachbarte Strukturen, wie Blasen Hals, Dickdarm, Beckenbodenmuskulatur ...

N - regionäre Lymphknoten

N0	keine regionären Lymphknotenmetastasen
N1	regionäre Lymphknotenmetastasen

M - Fernmetastasen

M0	keine Fernmetastasen
M1	Fernmetastasen